Der Sanderling

Tier des Monats Januar

An den Sandstränden der Nordsee ist au-Berhalb der Brutzeit fast überall in kleinen Trupps ein wenig scheues Watvögelchen zu beobachten, das wie ein Tennisball an der Brandung entlang "rollt". Die Vögel patroullieren in eiligem Trippelschritt lange Strandabschnitte, wobei sie immer knapp am Saum der auflaufenden Wellen entlang eilen als hätten sie Angst, nasse Füße zu bekommen, müssten aber unbedingt im Wasser herumpicken. Etwa so ist es ja

Der Sanderling gehört zur artenreichen Gattung der Strandläufer und ist gleich groß wie der häufige Alpenstrandläufer. Im Brutkleid ist seine Brust rostrot, der Rücken braun. Das Schlichtkleid ist oberseits hellgrau, unterseits rein weiß, nur die Schwungfedern

Anhand seines Aufenthaltsortes und seiner Bewegungsweise ist der Sanderling meist leicht von anderen Watvögeln zu unterscheiden. Er pickt am Spülsaum nach soeben angeschwemmten Kleinkrebsen oder Würmchen, doch sind die Beuteteile meist nicht zu erkennen. Er kann aber auch an toten Fischen und anderen großen Futterobjekten picken, und an nahrungsarmen Stränden in



Sanderling (Calidris alba)

Foto: KT

Wo ist der Sanderling zu finden?

Am Strand. Überall auf der Welt. Er ist ein Brutvogel der Hocharktis und zieht zur Überwinterung teilweise weit über den Äquator nach Süden. Seine wichtigsten Brutplätze sind Nordkanada, Grönland und Taymir in Sibirien. Er überwintert an fast allen Stränden der gemäßigten und tropischen Küsten.

Die 30.000 Sanderlinge des Wattenmeeres können sowohl aus Sibirien als auch von Grönland stammen, ihre Zugwege sind noch wenig erforscht. Da die Vögel beim Start zu Langstrekkenflügen bereits die Zielrichtung exakt einnehmen, ist es nach Beobachtungen in Schleswig-Holstein wahrscheinlich, dass Vögel von hier direkt nach Grönland fliegen.

Im Brutgebiet in der arktischen Tundra wählen Sanderlinge ähnliche Brutplätze wie Knutt und Sichelstrandläufer, aber sie brüten später. Dies spiegelt sich auch im späten Abzug aus dem Watt erst Anfang Juni wider. Zumindest in Sibirien legen die Weibchen 2 x 4 Eier, und jeder Altvogel versucht, ein Gelege aufzuziehen.

Für weitere Informationen bitte erfragen bei : Dipl.-Biol. Rainer Borcherding, Hafenstr. 3, 25813 Husum Tel. 04841/6685-42

r.borcherding@schutzstation-wattenmeer.de

Afrika fressen Sanderlinge sogar Körner. Hätten Sie gedacht, dass...

auch.

sind schwarz.

... der Sanderling auf Plattdeutsch auch "Keen Tied" = Keine Zeit heißt, weil er so hektisch läuft?

... er in Holland "Dreizehenstrandläufer" heißt, weil seine am Strand unnötige Hinterzehe vollkommen rückgebildet ist - was dem normalen Beobachter aber nicht unbedingt in's Auge springen wird...?

.. Sanderlinge als Langstreckenzieher bis zu 60% Fett im Körper anlagern können, was für einen Non-stop-Flug von 5000 km reicht?

... die Vögel an ihren Rastplätzen wohl sehr standorttreu sind, denn ein 1993 auf Helgoland beringter Sanderling war auch 2005 (alle Jahre wieder) dort?

... Sanderlinge sich am Strand leicht an Ol verschmutzen und dann - verklebt und ausgekühlt sogar an Pfützen in Inseldörfern nach Futter suchen?

... der Science-Fiction Autor Douglas Adams offensichtlich Sanderlinge meinte, als er in einem Buch schrieb, "am Strand liefen eilige kleine Vögel umher, die sich so bewegten, als hätte sie jemand sehr gewitztes aus der Schweiz konstruiert"?

Sanderlinge durch den Klimawandel in der Arktis Brutplätze verlieren, aber auch mehr Bruterfolg haben könnten?



